

Prevalência da Síndrome da Combinação em pacientes atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas no município de Vassouras-RJ

Autores: Carvalho FS, Duarte Júnior JAG, Goyatá FR, Rodrigues CRT*

Resumo

A Síndrome da Combinação descrita por Kelly em 1972 relaciona características clínicas e alterações fisiológicas em pacientes com Prótese Total Superior e Prótese Parcial Removível classe I de Kennedy inferior. O objetivo deste estudo foi identificar os sinais clínicos relacionados à Síndrome em pacientes atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Vassouras – RJ e conscientizar os cirurgiões-dentistas para realizar um diagnóstico precoce. Foi utilizado um formulário clínico com os dados do paciente: nome, endereço, data de atendimento, condição clínica inicial, trabalho protético proposto. Observou-se também o tratamento realizado, identificando possíveis sinais clínicos relacionados à Síndrome. Sete dos dezoito pacientes analisados (36,84%) apresentaram algum sinal clínico relacionado à Síndrome, e em doze pacientes (63,16%) não houve a presença destes sinais clínicos. As principais características relacionadas foram: perda acentuada de suporte ósseo na região anterior da maxila, aumento fibroso da tuberosidade maxilar, hiperplasia papilar dos tecidos do palato duro e da fibromucosa na região anterior da maxila, extrusão dos dentes anteriores inferiores e perda óssea na região da mandíbula posterior. Conclui-se que a reabilitação com Prótese Total Superior e Prótese Parcial Removível classe I de Kennedy inferior pode contribuir para o desenvolvimento de sinais clínicos que caracterizam a Síndrome da Combinação e que esta situação clínica deve ser do conhecimento dos cirurgiões-dentistas.

Palavras-Chave: Odontologia. Síndrome da Combinação. Sinais clínicos.