

# Exodontia de terceiro molar incluso inferior: relato de caso

*Apresentador/Autor: Oteciano Carvalheira Neto*

*Orientador: Orlando Izolani*

## Resumo

O terceiro molar inferior constitui o elemento dentário com maior prevalência de impaction e necessidade de exodontia. A determinação para a sua remoção se dá por meio de exames clínicos associados aos estudos radiográficos, nos quais se pode verificar o tipo e grau de impaction, e avaliar o nível de dificuldade durante o processo cirúrgico. O objetivo desse estudo consistiu em descrever, por meio de um relato de caso clínico as etapas adotadas na remoção de terceiros molares impactados. O dente apresentava-se com impaction mesial, e o paciente apresentava sintomatologia dolorosa, processo infeccioso e lesão. Verificou-se que a indicação para a exodontia de terceiros molares inferiores inclusos é uma medida profilática que vem sendo adotada por muitos cirurgiões bucomaxilofaciais devido à comorbidades associadas à impaction desses dentes. No entanto, os procedimentos a serem adotados em relação a estes dentes devem levar em consideração a necessidade de exame clínico, histórico e idade do paciente, a posição do dente e a antecipação das possíveis dificuldades durante o processo cirúrgico e riscos pós-cirúrgico.

**Palavras-Chave:** Exodontia. Dente incluso. Terceiro molar.