

Trombose venosa profunda e neoplasia mamária maligna: relato de caso em idosa

Eliton Edmilson Couto^{†*}, Jean Fialho Fazolo de Souza[†], Larissa Vaz Perez[†], Maria Júlia Campos[†], Roberta Maria Rola Albergaria[†], Hércio Serpa Figueiredo Júnior[†]

Resumo

A Trombose Venosa Profunda (TVP) é caracterizada pela formação de trombos no interior de veias profundas, mais comum nos membros inferiores (80 a 95% dos casos). A incidência da doença, no Brasil, mostra-se em torno de 0,6 por 1.000 habitantes/ano. A literatura descreve alguns fatores principais no processo de formação dos trombos: estase sanguínea, lesões do endotélio e estados de hipercoagulabilidade. As neoplasias também são reconhecidas como fatores de risco independentes para TVP. Como complicação grave da TVP, em sua fase aguda, cita-se a embolia pulmonar e, tardiamente, a síndrome pós-trombótica. O objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, idosa, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, em uso irregular das medicações. Concomitantemente, há 3 meses, a paciente foi diagnosticada com neoplasia mamária maligna, ainda sem início do tratamento. Ao exame físico a paciente apresentou-se com dor em membro inferior direito, sem hiperemia, com edema e sinal de Homans positivo. Como tratamento para TVP foi proposto uso de anticoagulante oral, e a paciente segue internada, em repouso, há 6 dias. Diante do caso apresentado, cabe destacar que é de suma importância compreender os fatores de risco para TVP, bem como suas alterações fisiológicas no organismo, o que é de extrema importância para o diagnóstico correto e o sucesso terapêutico de cada caso.

Palavras-chave: Trombose Venosa, Neoplasia, Fatores de Risco

Referências

1. Barros MVL, Pereira VSR, Pinto DM. Controvérsias no diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda pela ecografia vascular. *J Vasc Bras.* 2012;11(2):137-43.
2. Linares MA. Prevalência de neoplasias em 415 pacientes com trombose venosa profunda avaliados em hospital escola. *J Vasc Br.* 2004;3(4):347-349.
3. Rollo HA. Abordagem diagnóstica dos pacientes com suspeita de trombose venosa profunda dos membros inferiores. *J Vasc Br.* 2005;4(1):79-81.

Afiliação dos autores: † Universidade Severino Sombra, Pró-Reitoria de Ciências Médicas, Discente do curso de Medicina

‡ Universidade Severino Sombra, Pró-Reitoria de Ciências Médicas, Docente do curso de Medicina

* E-mail de contato não fornecido pelos autores.

Prova de correção.